

リリカ[®]カプセルを服用する方へ

リリカ[®]カプセルの製剤写真(実物大)



リリカ[®]カプセル
25mg



リリカ[®]カプセル
75mg



リリカ[®]カプセル
150mg

リリカ[®]カプセルは、過剰に興奮した神経から発信される痛みの信号を抑え、痛みをやわらげるお薬です。


- 1 体にお薬を慣れさせるために、
医師の指示に従い「最初は少量から」開始します。

お薬の効果をみながら、眠気、ふらつきなどの副作用を少なくするためです。

- 2 体がお薬に慣れてきたら、痛みがやわらぐ量まで少しずつ増やし「あなたに適した量」をみつけていきます。

「用量調節が可能」なお薬です。
「もう少し痛みをやわらげたい」、
「副作用なのか気になる症状がある」
などと感じることがあれば、医師または
薬剤師にご相談ください。

効き目のあられ方のイメージ



- 3 痛みが長期間続いている場合は、治療にも時間がかかることがあります。痛みの軽減とともに、痛みにより制限されていた「日常生活などの改善」を実感しながら、一步ずつ、痛みの治療に取り組みましょう。

痛みの軽減に伴い、お薬をやめることも可能です。医師と相談しましょう。

増量の一例(高齢者など腎機能が低下している方の場合)

服用開始は
25mg/回から



徐々に増やして
75mg~150mg/日



必要に応じて
150mg~300mg/日

※裏面もご覧ください。

リリカ®カプセル服用にあたってのご注意

- このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。
 - 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
 - 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。
- 人により体重が増えることがありますので、気になる徴候があらわれた場合は、ご相談ください。
- 腎臓が悪い方、透析を受けている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ずご相談ください。
- ほかにお薬を服用している場合（薬局で買ったお薬も）、必ずお伝えください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- 服用し忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を服用してください。絶対に2回分を一緒に服用しないでください。
- ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。

気になる症状がある場合、わからないことがある場合は、
医師または薬剤師にご相談ください。

